SATISFAR WG®

AGROQUIM

ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida de acción sistémica y translaminar. Tiene un amplio espectro de acción contra hongos patógenos, particularmente Deuteromicetos, Ascomicetos y Basidiomicetos e, incluso varias especies de Ficomicetos.

NOMBRE COMÚN: Azoxistrobina.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Gránulos Dispersables en Agua que contiene 500 g de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios, excepto con aquellos de reacción alcalina.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Cuidado.

RECOMENDACIONES PARA SU USO: La aplicación debe ser preventiva. Maneje el producto dentro de un programa de control que alterne **SATISFAR WG®** con otros fungicidas, con mecanismos de acción bioquímica diferente y sin antecedentes de resistencia. **SATISFAR WG®** es un producto con acción "unisitio", por lo que se debe rotar con los "multisitio".

MODO DE EMPLEO: Debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.
Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En un recipiente limpio, diluya la dosis recomendada en agua. Vierta los gránulos, completamente disueltos, en el tanque o recipiente de aspersión. Cuando se trate de aplicar **SATISFAR WG®** con otros fitosanitarios compatibles, haga las mezclas en recipientes separados y luego vierta su contenido en el tanque de aspersión.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para obtener un control óptimo y económico **SATISFAR WG®**, debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 15 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.

Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda incluir **SATISFAR WG®** en un programa de manejo de enfermedades, con productos de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas.

FRASES DE ADVERTENCIA: Conservar el producto en su envase original y en un lugar cerrado fuera del alcance de los niños. No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para consumo humano o animal. No emplear el envase para otro fin. Antes de destruir el envase, enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) durante tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación, luego dispóngalo en un vertedero controlado. En caso de derrame del producto, recoja con material absorbente (aserrín), y colocar los residuos en un recipiente adecuado para su eliminación y dispóngalos adecuadamente de acuerdo a la normatividad local.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS: En caso de intoxicación accidental por:
Inhalación: Retirar al paciente de la zona de exposición, llevarlo a un lugar fresco y ventilado, mantenerlo caliente y en reposo.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua limpia, manteniendo los párpados separados durante 15 minutos. Contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón.

INGESTIÓN: No provocar el vómito.

CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

SÍNTOMAS: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

DIAGNÓSTICO: Se pueden presentar náuseas, vómito, diarrea y dolores abdominales.

TRATAMIENTO: Tratamiento sintomático. Administrar Carbón activado en grandes cantidades de agua y un laxante.

PRECAUCIONES: SATISFAR WG® puede causar moderada irritación después del contacto ocular, ligeramente irritante de la piel, por lo tanto use ropa de protección adecuada: Guantes, mascarillas, gorras, gafas, overol y botas de caucho.

PRESENTACIONES:
Funda x 30 g.
Funda x 60 g.
Funda x 600 g.

REGISTRO NORMA ANDINA: 077-F4/NA

DISTRIBUIDO POR: AGROQUÍM C. LTDA.

RECOMENDACIONES DE USO DE SATISFAR WG®:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (g/ha)	P.C. (DÍAS)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
BRÓCOLI *(Brassica oleracea* var. *itálica)*	Manchas foliares Potra de las crucíferas	*Alternaria* sp./*Phoma lingam* *Plasmodiophora brassicae*	150 - 200 0.9 g/l (al trasplante) 400 g/ha (drench)	2
CEBOLLA PERLA *(Allium cepa)*	Quemazón	*Stemphylium vesicarium* *Alternaria porri*	170 - 200	2
MANGO *(Mangifera indica)*	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporioides*	300 - 350	2
PEPINO *(Cucumis sativus)*	Mancha foliar	*Cercospora citrulina*	200 - 250	2
ROSA *(Rosa* sp.*)*	Mildiu polvoriento Mildiu velloso	*Sphaeroteca* sp. *Peronospora sparsa*	450 - 600 600 - 800	NA.
TOMATE *(Lycopersicum sculentum)*	Tizón temprano	*Alternaria solani*	150 - 200	2
TOMATE DE ÁRBOL *(Solanum betaceum)*	Antracnosis	*Colletotrichum gloeosporioides*	250	10
SANDÍA	MIldeu velloso	*Pseudoperonospora*		2

***PC:** (Período de Carencia) Intervalo de Seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.
NA: No aplica por no tratarse de un cultivo alimenticio.